Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 04:58

Link do produktu: https://edoniczki.pl/agrecol-borowki-nawoz-do-borowek-i-jagod-kamczackich-350g-p-1433.html



Agrecol – Borówki – nawóz do borówek i jagód kamczackich 350g

Cena	**18,50 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**AGR131**
Producent	**AGRECOL**
Zastosowanie	**Nawóz**
Producent	**AGRECOL**
Pojemność	**350g**

Opis produktu

Agrecol – Borówki – nawóz do borówek i jagód kamczackich 350g

Krystaliczny nawóz NPK 21–6–16 z magnezem i mikroskładnikami do borówek oraz jagód kamczackich. Łatwo rozpuszcza się w wodzie i działa interwencyjnie, uzupełniając niedobory składników pokarmowych. Zakwasza podłoże i utrzymuje odczyn wymagany przez rośliny kwasolubne. Wspiera krzewienie, wzrost i owocowanie. Opakowanie wystarcza na 350 l roztworu przy dawce 1 g/l.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz pojemość: 350g

Wymiary i specyfikacja

Rodzaj	Krystaliczny
Zawartość netto	350 g
Azot (N), całkowity	21%
Azot azotanowy	12,2%
Azot amonowy	8,8%
Pięciotlenek fosforu (P_2O_5), rozpuszczalny w wodzie	6%
Tlenek potasu (K_2O), rozpuszczalny w wodzie	16%
Tlenek magnezu (MgO), rozpuszczalny w wodzie	2%
Miedź (Cu)	0,02%; całkowicie rozpuszczalny w wodzie, schelatowany przez EDTA
Żelazo (Fe)	0,07%; całkowicie rozpuszczalny w wodzie, schelatowany przez EDTA
Mangan (Mn)	0,04%; całkowicie rozpuszczalny w wodzie, schelatowany przez EDTA
Cynk (Zn)	0,015%; całkowicie rozpuszczalny w wodzie, schelatowany przez EDTA
Postać i granulometria	Proszek; co najmniej 90% produktu przechodzi przez sito o oczkach 1 mm
Zakres pH gwarantujący stabilność chelatów	4–7
Składniki	Azotan amonu (CAS 6484-52-2), azotan potasu (CAS 7757-79-1), fosforan monoamonowy (CAS 7722-76-1), siarczan magnezu jednowodny (CAS 14168-73-1)

Kategoria materiałów składowych	CMC 1: pierwotne surowce i mieszaniny
Trwałość	10 lat
UFI	KW40-T0AJ-X00W-HHMA

Zawartość składników podano w procentach masowych (% m/m).

Zastosowanie

Do wszystkich odmian borówek amerykańskich, jagód kamczackich i innych wymagających roślin kwasolubnych.

Termin nawożenia	Cały okres wegetacyjny
Częstotliwość	Co 14 dni
Kwitnienie i owocowanie	Co 7 dni
Dawka	5 g (1 łyżeczka) na 5 l wody; 1 g na 1 l
Ilość roztworu	5 l na 1 m² powierzchni pod krzewem

Rozpuść odmierzoną dawkę w wodzie i podlej powierzchnię pod krzewem. Nawóz można stosować w systemach nawadniania kropelkowego. Stosuj wyłącznie w uzasadnionej potrzebie i nie przekraczaj dawki.

Bezpieczeństwo

Uwaga. Działa drażniąco na oczy. Chroń przed dziećmi. Dokładnie umyj ręce po użyciu. Stosuj ochronę oczu lub twarzy.

W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płucz wodą przez kilka minut. Wyjmij soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć, i nadal płucz. Jeśli podrażnienie utrzymuje się, zasięgnij porady lekarza. Nie spożywaj. W razie połknięcia niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem i pokaż opakowanie lub etykietę. Zanieczyszczone oczy lub skórę natychmiast przemyj dużą ilością wody i zasięgnij porady lekarza.

Przechowuj wyłącznie w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym i ciemnym miejscu, w temperaturze od 2°C do 30°C. Rozsypany nawóz zbierz na sucho; w razie konieczności zabrudzoną powierzchnię spłucz dużą ilością wody.

Zawartość opakowania

Jedno opakowanie nawozu: 350 g.