Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 08:54

Link do produktu: https://edoniczki.pl/florovit-azofoska-granulat-uniwersalny-nawoz-p-1586.html




# Florovit – Azofoska granulat uniwersalny nawóz

| | |
|---|---|
| Cena | **19,50 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **FLO** |
| Producent | **FLOROVIT** |
| Zastosowanie | **Nawóz** |
| Producent | **FLOROVIT** |

## Opis produktu

## Florovit – Azofoska granulat uniwersalny nawóz

Azofoska granulowana to kompleksowy nawóz mineralny NPK 13,3–6,1–17,1 z magnezem, siarką oraz borem, miedzią, żelazem, manganem, molibdenem i cynkiem. Przeznaczony do warzyw, kwiatów jednorocznych i wieloletnich oraz drzew i krzewów ozdobnych i owocowych. Ma niską zawartość chlorków. Granulowana postać ułatwia równomierny wysiew. Szczególnie zalecany przed siewem i sadzeniem; dawkę dobiera się do konkretnej uprawy. Gramaturę wybiera się w wariancie zakupu.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wybierz pojemość**: 1kg , 5kg , 10kg , 25kg

## Wymiary i specyfikacja

| | |
|---|---|
| Rodzaj | Granulowany nawóz mineralny |
| Zawartość netto | Zgodnie z wybraną gramaturą |
| Azot (N), całkowity | 13,3% |
| Azot azotanowy | 5,5% |
| Azot amonowy | 7,8% |
| Pięciotlenek fosforu ($P_2O_5$), całkowity | 6,1% |
| $P_2O_5$ rozpuszczalny w wodzie | 4% |
| $P_2O_5$ rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu | 6,1% |
| Tlenek potasu ($K_2O$), rozpuszczalny w wodzie | 17,1% |
| Tlenek magnezu (MgO), całkowity | 4,5% |
| MgO rozpuszczalny w wodzie | 3,5% |
| Tritlenek siarki ($SO_3$), całkowity | 21% |
| $SO_3$ rozpuszczalny w wodzie | 21% |
| Bor (B) | 0,025%; jako kwas, rozpuszczalny w wodzie |
| Miedź (Cu) | 0,09%; jako siarczan, rozpuszczalny w wodzie |
| Żelazo (Fe) | 0,14%; jako siarczan, rozpuszczalny w wodzie |
| Mangan (Mn) | 0,14%; jako siarczan, rozpuszczalny w wodzie |
| Molibden (Mo) | 0,02%; jako molibdenian amonu, rozpuszczalny w wodzie |
| Cynk (Zn) | 0,025%; jako siarczan, rozpuszczalny w wodzie |

Zawartość składników podano w procentach masowych (% m/m).

| | |
|---|---|
| Azotan amonu (CAS 6484-52-2) | 25% do poniżej 40% |

| | |
|---|---|
| Siarczan manganu(II) jednowodny (CAS 10034-96-5) | 0,1% do poniżej 1% |
| Siarczan miedzi pięciowodny (CAS 7758-99-8) | 0,1% do poniżej 1% |
| Kwas borowy (CAS 10043-35-3) | Poniżej 0,3% |
| Siarczan cynku siedmiowodny (CAS 7446-20-0) | 0,1% do poniżej 1% |

## Zastosowanie

Nawożenie doglebowe warzyw, kwiatów jednorocznych i wieloletnich, drzew oraz krzewów ozdobnych i owocowych. Rozsypuj nawóz wokół roślin. Nie nawoź w pełnym słońcu. Jeśli nawóz jest zbrylony, dokładnie rozkrusz go przed użyciem.

### Warzywa

| | |
|---|---|
| kapusta późna, kapusta brukselska, kapusta czerwona, kalafior, dynia | 120–150 g/m²; jednorazowo, przed siewem/sadzeniem. 25% dawki można zastosować 2-3 tygodnie po posadzeniu rozsady |
| cebula, por, seler | 120–150 g/m²; jednorazowo, przed siewem/sadzeniem. 25% dawki można zastosować pogłównie – nie później niż do 15 czerwca |
| burak ćwikłowy, kalarepa, czosnek, papryka | 60–70 g/m²; jednorazowo, przed siewem/sadzeniem. w uprawie buraka 20% dawki 2-3 tygodnie po wschodach |
| pomidor, ogórek, pietruszka, marchew | 100–120 g/m²; jednorazowo, przed siewem/sadzeniem. najlepiej kilka dni przed siewem/sadzeniem |
| kapusta wczesna | 80–100 g/m²; jednorazowo, przed siewem/sadzeniem. najlepiej kilka dni przed siewem/sadzeniem |
| sałata, rzodkiewka, brukiew | 50–60 g/m²; jednorazowo, przed siewem/sadzeniem. najlepiej kilka dni przed siewem/sadzeniem |
| fasola, groch, bób | 30–40 g/m²; jednorazowo, przed siewem/sadzeniem. najlepiej kilka dni przed siewem/sadzeniem |
| kukurydza cukrowa | 40–60 g/m²; jednorazowo, przed siewem/sadzeniem. najlepiej kilka dni przed siewem/sadzeniem |

Zastosuj możliwie wcześnie i wymieszaj z warstwą gleby o grubości 10–20 cm. W pierwszym roku uprawy po zastosowaniu obornika zmniejsz dawkę o 20–40%.

### Kwiaty i rośliny ozdobne

| | |
|---|---|
| chryzantema, piwonia, irys, tulipan, bratek, dalia, słonecznik, cynia, goździk, lewkonia, mieczyk | 50–80 g/m² |
| begonia, nagietek, aster, petunia, lilia, aksamitka, narcyz, stokrotka, szałwia | 40–60 g/m² |
| szarłat, maciejka, nasturcja, pelargonia, rdest | 30–40 g/m² |

Nawoź raz, wiosną po rozmarznięciu gleby. Dla roślin kwitnących latem możesz powtórzyć nawożenie w połowie maja, stosując połowę dawki. W miarę możliwości wymieszaj nawóz z glebą.

### Drzewa i krzewy ozdobne

| | |
|---|---|
| drzewa i krzewy iglaste oraz liściaste – przed sadzeniem | 40–50 g/m²; jednorazowo, wiosną. przed posadzeniem nawóz wymieszać z warstwą gleby o miąższości 20 cm; stosować 50% dawki jeśli stosujemy kompost lub obornik |
| drzewa i krzewy iglaste | 30–40 g/m²; jednorazowo, wiosną. Wymieszaj nawóz z glebą, uważając na korzenie. |

### Drzewa i krzewy owocowe

| | |
|---|---|
| drzewa owocowe w 1 roku po posadzeniu | 15–30 g/m²; dwukrotnie, wczesną wiosną i w połowie czerwca |
| sady młode (2-4 letnie) | 60–80 g/m²; jednorazowo, wiosną |
| sady owocujące (powyżej 4 lat) | 40–60 g/m²; jednorazowo, wiosną |
| porzeczki i agrest | 50–70 g/m²; jednorazowo, wiosną |
| maliny, truskawki w 1 roku | 40–60 g/m²; jednorazowo, wiosną |
| truskawki w latach następnych | 20–40 g/m²; jednorazowo, wiosną |

Nawóz rozsypuj w szerokim pierścieniu, od 20–30 cm od drzewka do końca rozrastających się młodych, nieciętych pędów korony. Krzewy jagodowe w pierwszych latach nawoź raz wiosną. Po rozpoczęciu owocowania podziel dawkę na dwie połowy: pierwszą zastosuj 2 tygodnie przed kwitnieniem, drugą 2 tygodnie po kwitnieniu.

### Trawniki rekreacyjne

| | |
|---|---|
| rekreacyjne | 30 g/m²; od wiosny, co 4 tygodnie. nawozić po skoszeniu trawy; stosować do 15 sierpnia; nie przekraczać łącznej dawki 150 g/m2 w roku |

### Podłoża z udziałem torfu wysokiego

| | |
|---|---|
| siewki wrażliwe na zasolenie podłoża | do 2,0 kg/m³; dawkę nawozu ustalić na podstawie analizy chemicznej podłoża |
| siewki mało wrażliwe na zasolenie podłoża | do 1,5 kg/m³; dawkę nawozu ustalić na podstawie analizy chemicznej podłoża |
| rozsady wrażliwe na zasolenie podłoża | do 1,5 kg/m³; dawkę nawozu ustalić na podstawie analizy chemicznej podłoża |
| rozsady mało wrażliwe na zasolenie podłoża | do 1,0 kg/m³; dawkę nawozu ustalić na podstawie analizy chemicznej podłoża |

### Gleba i ziemie ogrodnicze

| | |
|---|---|
| warzywa | 150–250 g/m²; przedwegetacyjnie, w zależności od zasobności gleby i uprawianego gatunku |
| rośliny ozdobne | 100–200 g/m²; przedwegetacyjnie, w zależności od zasobności gleby i uprawianego gatunku |
| warzywa, rośliny ozdobne | do 50 g/m²; pogłównie |

### Pozostałe uprawy

| | |
|---|---|
| ziemniaki wczesne | 50–60 g/m²; przedsiewnie, wczesną wiosną co najmniej 1 tydzień przed siewem/sadzeniem. w dobrych stanowiskach dawkę można zmniejszyć o 10% |
| ziemniaki późne | 75–80 g/m²; przedsiewnie, wczesną wiosną co najmniej 1 tydzień przed siewem/sadzeniem. w dobrych stanowiskach dawkę można zmniejszyć o 10% |
| kukurydza na ziarno | 85–90 g/m²; przedsiewnie, wczesną wiosną co najmniej 1 tydzień przed siewem/sadzeniem. przy założeniu co najmniej średniej zasobności gleby w fosfor |
| kukurydza na zielonkę | 90–95 g/m²; przedsiewnie, wczesną wiosną co najmniej 1 tydzień przed siewem/sadzeniem |
| zboża jare | 70–75 g/m²; przedsiewnie, wczesną wiosną co najmniej 1 tydzień przed siewem/sadzeniem |
| jęczmień browarny | do 60 g/m²; przedsiewnie, wczesną wiosną co najmniej 1 tydzień przed siewem/sadzeniem |

## Bezpieczeństwo

Uwaga. Działa drażniąco na oczy. Chroń przed dziećmi. Stosuj rękawice ochronne. Jeśli potrzebujesz porady lekarza, pokaż pojemnik lub etykietę. Nie jedz ani nie pij podczas stosowania. Po zakończeniu pracy umyj ręce.

Po dostaniu się do oczu płucz je obficie wodą o temperaturze pokojowej przez 15 minut. Nie pocieraj i nie zamykaj oczu. Wyjmij soczewki kontaktowe, jeżeli można je łatwo usunąć; nie usuwaj soczewek przyklejonych do oka. Nadal płucz i jak najszybciej skontaktuj się z lekarzem.

Po kontakcie ze skórą zdejmij zanieczyszczoną odzież i buty. Umyj skórę neutralnym mydłem i obficie spłucz wodą. Przy wyraźnych dolegliwościach skontaktuj się z lekarzem. Po połknięciu wypłucz usta i gardło, nie wywołuj wymiotów i skontaktuj się z lekarzem. Jeśli wystąpią wymioty, pochyl głowę do przodu. Zapewnij spokój. Przy objawach po wdychaniu pyłu wyjdź na świeże powietrze; jeżeli objawy nie ustępują, wezwij pomoc lekarską.

Rozsypany nawóz dokładnie zbierz, pozostałość zmyj wodą. Unikaj wzbijania i wdychania pyłu. Przechowuj w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od żywności, źródeł ciepła, promieniowania i elektryczności statycznej. Data ważności znajduje się na opakowaniu.

## Zawartość opakowania

Jedno opakowanie nawozu, zgodnie z wybraną gramaturą.