Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 15:55

Link do produktu: https://edoniczki.pl/florovit-nawoz-do-borowek-i-kwasolubnych-p-1597.html



Florovit – Nawóz do borówek i kwasolubnych

Cena	**19,50 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**FLO**
Producent	**FLOROVIT**
Zastosowanie	**Nawóz**
Producent	**FLOROVIT**

Opis produktu

Florovit – Nawóz do borówek i kwasolubnych

Granulowany nawóz mineralny NPK (Mg) 12–6–13 (2,6) do borówek i innych roślin kwaśnolubnych. Zawiera azot amonowy, fosfor, potas, magnez oraz bor, miedź, żelazo, mangan, molibden i cynk. Przeznaczony do posypowego nawożenia; dawka i termin zależą od gatunku, wieku oraz wielkości rośliny.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz pojemość: 1kg , 3kg , 5kg

Wymiary i specyfikacja

Rodzaj	Granulowany nawóz mineralny
Zawartość netto	1 kg / 3 kg / 4 kg / 5 kg
Azot (N), całkowity	12%
Azot amonowy	12%
Pięciotlenek fosforu (P_2O_5), całkowity	6%
P_2O_5 rozpuszczalny w wodzie	3,9%
P_2O_5 rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu	6%
Tlenek potasu (K_2O), rozpuszczalny w wodzie	13%
Tlenek magnezu (MgO), całkowity	2,6%
MgO rozpuszczalny w wodzie	2,6%
Bor (B)	0,05%; jako kwas, rozpuszczalny w wodzie
Miedź (Cu)	0,1%; jako siarczan, zawartość całkowita
Żelazo (Fe)	0,5%; jako siarczan, zawartość całkowita
Mangan (Mn)	0,27%; jako siarczan, zawartość całkowita
Molibden (Mo)	0,005%; jako molibdenian amonu, rozpuszczalny w wodzie
Cynk (Zn)	0,04%; jako siarczan, zawartość całkowita

Zawartość składników podano w procentach masowych (% m/m).

Zastosowanie

Do borówek oraz innych roślin kwaśnolubnych: różaneczników, azalii, wrzośców, paproci i iglaków.

Borówki — rozpoczęcie	Początek wzrostu wiosną, zwykle połowa kwietnia
Borówki — częstotliwość	3 nawożenia, co 4 tygodnie; zakończ do 15 czerwca

Borówki — pierwszy rok po posadzeniu	3 razy po 20 g/m²
Borówki — dalsze lata uprawy	3 razy po 30–35 g/m²
Różaneczniki — sadzenie	25–50 g na roślinę, wymieszane z 25–50 l ziemi z dołka
Różaneczniki — pierwszy rok	W marcu około 20 g i w kwietniu około 20 g na roślinę
Różaneczniki — drugi rok	W marcu około 25 g i w kwietniu około 25 g na roślinę
Różaneczniki — dalsze lata	W marcu około 30 g i w kwietniu około 30 g na roślinę
Azalie i wrzośce — sadzenie	Około 10 g na 10 l ziemi
Azalie i wrzośce — następne lata	W kwietniu około 10 g na roślinę; przy roślinach 3–4-letnich i starszych powtórz po 2–3 miesiącach
Azalie i wrzośce — pojemniki	Nie przekraczaj 1 g na 1 l podłoża
Paprocie i iglaki — warunek stosowania	Gleba za mało kwaśna: pH powyżej 6
Paprocie i iglaki — przed sadzeniem	Jednorazowo około 10 g na roślinę, wymieszane z 10–20 l gleby
Paprocie i iglaki — kolejne lata	Jednorazowo wczesną wiosną około 10 g na roślinę
Iglaki — dawka pogłówna przy wysokości 0,5 m	20 g na roślinę
Iglaki — dawka pogłówna przy wysokości 1 m	40 g na roślinę
Iglaki — dawka pogłówna przy wysokości 2 m	60 g na roślinę
Miara pomocnicza	1 łyżka stołowa to średnio 10 g nawozu

Rozsyp nawóz pod koroną rośliny i delikatnie wymieszaj z wierzchnią warstwą gleby, nie uszkadzając korzeni. Podlej rośliny.

Bezpieczeństwo

Przechowuj w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym miejscu. Unikaj źródeł ciepła i promieniowania. Przechowuj z dala od środków spożywczych.

Po kontakcie ze skórą zdejmij zanieczyszczoną odzież i umyj skórę wodą z neutralnym mydłem. Oczy obficie płucz wodą o temperaturze pokojowej przez 15 minut; usuń soczewki, jeżeli nie są przyklejone do oczu. Jak najszybciej skonsultuj się z lekarzem. Po połknięciu nie wywołuj wymiotów, wypłucz usta i gardło oraz pozostaw poszkodowanego w spoczynku.

Zawartość opakowania

Jedno opakowanie nawozu o masie zgodnej z wybranym wariantem: 1 kg / 3 kg / 4 kg / 5 kg.