

Link do produktu: <https://edoniczki.pl/florovit-nawoz-do-iglakow-przeciw-brazowieniu-igiel-p-1654.html>

Florovit – Nawóz do iglaków przeciw brązowieniu igieł

Cena	22,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FLO
Producent	FLOROVIT
Zastosowanie	Nawóz
Producent	FLOROVIT

Opis produktu

Florovit – Nawóz do iglaków przeciw brązowieniu igieł

Preparat ogrodniczy do pielęgnacji i odżywiania roślin zgodnie z przeznaczeniem oraz dawkowaniem podanym przez producenta.

Najczęstszą przyczyną obumierania drzew iglastych jest niedobór składników pokarmowych. Po pewnym czasie od posadzenia następuje zmiana koloru igieł do jasnozielonego, następnie żółtego, w końcu igły brunatnieją i opadają a drzewo obumiera.

Zastosowanie

Po pewnym czasie od posadzenia następuje zmiana koloru igieł do jasnozielonego, następnie żółtego, w końcu igły brunatnieją i opadają a drzewo obumiera.

Sposób stosowania

Zalecaną dawkę nawozu rozsypać równomiernie pod koroną drzew lub krzewów. Następnie należy rośliny obficie podlać. Nawóz można stosować przez cały rok w miarę potrzeb. Szczególnie wskazane jest stosowanie nawozu w momencie pojawienia się pierwszych objawów brunatnienia igieł. Nawóz można stosować również w formie oprysków dolistnych. Do tego zabiegu zaleca się około 5% roztwór nawozu (500 g nawozu na 10 l wody). Przy silnym niedoborze zabieg ten należy powtórzyć 2 - 3 razy w odstępach 14-dniowych. Wielkość drzewa lub krzewu Zalecana dawka do 1 m 25 g/m 2 od 1 m do 2 m 50 g/m 2 od 2 m do 5 m 100 g/m 2 od 5 m do 10 m 150 g/m 2 powyżej 10 m 200 g/m 2 Nawóz polecany jest także pod wszystkie rośliny, u których występuje ryzyko niedoboru magnezu. Przedwegetacyjnie: dawkę jednorazową 25 g/m 2 powierzchni uprawnej należy wymieszać z co najmniej 10-centymetrową warstwą gleby. Pogłównie: dawkę jednorazową 10 g/m 2 powierzchni uprawnej należy stosować posypowo lub dolistnie, opryskując rośliny....

Skład

ników pokarmowych. Po pewnym czasie od posadzenia następuje zmiana koloru igieł do jasnozielonego, następnie żółtego, w końcu igły brunatnieją i opadają a drzewo obumiera. Opisane objawy nie są spowodowane przez szkodniki. Są to skutki niewłaściwego zaopatrzenia w składniki pokarmowe - najczęściej występuje niedobór magnezu. Ponieważ przyswajalność składników z gleby zmniejsza się bardzo w glebie suchej, opisane objawy niedoboru najczęściej widoczne są w okresach suszy. Niedoborom tym można zapobiegać poprzez dostarczenie drzewom magnezu, zarówno w drodze nawożenia doglebowego, jak również dokarmiania dolistnego.

Ważne: pierwszeństwo mają aktualne informacje, dawkowanie i środki ostrożności podane na etykiecie producenta.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz pojemność: 1kg , 3kg

Wymiary i specyfikacja

Potwierdzone parametry techniczne produktu:

- Przedwegetacyjnie: dawkę jednorazową 25 g/m² powierzchni uprawnej należy wymieszać z co najmniej 10-centymetrową warstwą gleby.
- Pogłównie: dawkę jednorazową 10 g/m² powierzchni uprawnej należy stosować posypowo lub dolistnie, opryskując rośliny 5% roztworem przy zużyciu 50-100 ml cieczy użytkowej na 1 m² powierzchni uprawnej.
- Skład nawozu:

Zastosowanie

Do nawożenia lub pielęgnacji roślin zgodnie z przeznaczeniem wskazanym na etykiecie producenta. Dawkę, częstotliwość i termin stosowania należy zawsze dopasować do konkretnego produktu oraz gatunku rośliny.

Bezpieczeństwo

Przed użyciem przeczytaj etykietę i instrukcję producenta. Stosuj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i zalecanym dawkowaniem. Przechowuj w oryginalnym opakowaniu, poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Nie używaj produktu, jeśli opakowanie lub oznakowanie jest uszkodzone albo nieczytelne.

Zawartość opakowania

Jedna sztuka produktu, chyba że nazwa oferty wyraźnie wskazuje sprzedaż w zestawie lub opakowaniu wielosztukowym.